

Procedure per la corretta manutenzione del fondo in erba dell'impianto sportivo.

Il manto in erba necessita di continua manutenzione e cura per poter mantenere il suo stato e la sua efficienza. Deve essere effettuato il taglio in maniera sistematica e programmata senza lasciare il residuo sul fondo. Il deposito del residuo di taglio può causare, per effetto della sua fermentazione e del suo degrado, danni al manto erboso con perdita dello stesso e l'insorgere di possibili malattie fungine.

Quindi le indicazioni da seguire per il taglio sono principalmente le seguenti:

- tagliare il manto erboso a foglia più asciutta possibile (quindi fare attenzione nei periodi piovosi).
- tagliare e asportare sempre il tagliato.

Il fondo per mantenere la sua durata e efficienza necessita di essere concimato, il ciclo prevede 4 trattamenti annui (1 volta a stagione) con prodotti ternari bilanciati a rilascio controllato.

Concimazione Settembre/Ottobre. Concime agricolo a rapido rilascio, a base di potassio con titolo: 13-0-46. (200 kg di prodotto)

Concimazione Febbraio. Concime agricolo a rapido rilascio, a base di azoto con titolo: 33-0-0. (200 kg di prodotto)

Concimazione Aprile. Concime microgranulato pellicolato con rilascio controllato, a base di microelementi, NPK + microelementi "proturf". (200 kg di prodotto)

Concimazione Giugno. Concime microgranulato pellicolato con rilascio controllato, a base di microelementi, NPK + microelementi "proturf". (200 kg di prodotto)

Inoltre per la manutenzione del manto si devono seguire le seguenti indicazioni:

- avere sempre a disposizione sabbia silicea di fiume e seme, per sistemare i danni che creano i giocatori.
- non fare riscaldamento o torelli sempre negli stessi punti.
- preservare il più possibile le aree di porta (che saranno quelle sempre più martorate e danneggiate).
- rullare con rullo leggero solamente in alcuni casi, non sempre per qualsiasi motivo.
- nel periodo estivo, far attenzione a impostare bene l'impianto irriguo.
- in inverno e estate, far attenzione all'insorgenza di possibili malattie fungine (zone gialle del prato di forma tondeggiante).